

Alfamino® HMO®

400 g e

Instantní kojenecká výživa určená pro řízenou dietní výživu při těžké alergii na bílkoviny kravského mléka a/nebo při mnohačetných potravinových alergiích.

- ✓ Hypoalergenní kojenecká výživa s obsahem aminokyselin
- ✓ 2'-FL (2'-fukosyllaktosa) a lakto-N-neotetraosa
- ✓ s MCT tuky a strukturovanými lipidy

POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY. OD NAROZENÍ.

Důležitá upozornění:

Kojení je během prvních měsíců života dítěte nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky náhradní kojenecké výživy. Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Nutričně kompletní potravina. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy od narození nebo jako součást smíšené stravy od ukončeného 6. měsíce.

Kontraindikace: galaktosemie, glukózo-galaktózová malabsorpce.

Návod na přípravu:

1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce.
2. Láhev, uzávěr, savičku a další příslušenství řádně vymyjte, aby uvnitř nezůstaly zbytky výživy.
3. Vyvářejte po dobu 5 minut. Nádobu během vyváření ponechte až do vyjmutí lahvičky uzavřenou.
4. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit na teplotu přibližně 37 °C a méně.
5. Přesné množství vlažné převařené vody (viz tabulka) nalijte do vyvařené lahvičky.
6. Přiloženou odměrkou odměřte potřebné množství prášku (viz tabulka) a nasypte je do lahvičky. Odměrka musí být vždy zarovnaná.
7. Důkladně protřepte až do úplného rozpuštění prášku.
8. Po každém použití plechovku důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě.

Upozornění:

Při přípravě stravy se může používat pouze převařená pitná voda vhodná pro kojence. Vaše dítě může onemocnět z nepřevařené vody, znečištěného nádobí, z nesprávně naředěné výživy či nesprávného uchovávání výrobku. Připravujte vždy jen jednu dávku. Dodržujte přesně návod k přípravě. Krmte ihned po přípravě. Nepotřebovanou porci neuchovávejte, obsah zlikvidujte. Během krmení držte dítě vždy v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít ke vdechnutí výživy a zalknutí.

Tabulka dávkování:

Věk dítěte	Množství na 1 krmení		Počet krmení za den
	Převařená voda (ml)	Počet zarovnaných odměrek **	
1.- 2. týden	90	3	6
3.- 4. týden	120	4	5
2. měsíc	150	5	5
3.- 4. měsíc	180	6	5
5.- 6. měsíc	210	7	5
od 7. měsíce ***	210	7	3-4

Velikost odměrky: 4,4 g

** Poznámka: Neměňte poměr prášku a vody. Používejte pouze přibalenou odměrku. Nedávejte více ani méně prášku, než je uvedeno v tabulce, jinak může dojít k dehydrataci nebo k podvýživě dítěte.

*** Přechod na jiný druh kojenecké výživy nebo nemléčného příkrmu konzultujte se svým dětským lékařem.

Složení:

Glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový, strukturovaný palmový), aminokyseliny (L-lysin-
acetat, L-leucin, L-prolin, L-glutamin, L-arginin, L-valin, glycin, L-isoleucin, L- threonin, L-serin, L-
fenylalanin, L-thyrosin, L-asparagova kyselina, L-histidin, L-alanin, L-cystin, L- aspartat hořečnatý, L-
tryptofan, L-methionin), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT tuky), škrob, minerální látky
(glycerofosforečnan vápenatý, chlorid draselný, citronan sodný, vápenaté soli kyseliny citronové,
citronan draselný, sodné soli kyseliny fosforečné, oxid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran
měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný), emulgátor (E 472c), vlákniny (2'-
fukosyllaktosa, lakto-N-neotetraosa), olej z Mortierella alpina (ARA), olej z mikrořas Schizochtrium sp.
(DHA), cholin bitartát, vitamíny (C, E, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, A, thiamin, B6, kyselina
listová, K, D, biotin, B12), regulátor kyselosti (E 330), taurin, inositol, L-karnitin.

Bez lepku. Bez laktózy. Baleno v ochranné atmosféře. Uchovejte v suchu při pokojové teplotě a
spotřebujte do 3 týdnů od otevření.

Minimální trvanlivost do (EXP): viz karton.

Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika.

Tel.: 800 135 135; www.nestlehealthscience.cz

Výživové údaje		Na 100 g	Na 100 ml
Energie	kJ	2083	277
	kcal	497	66
Tuky (44 % kcal): z toho:	g	24,6	3,3
nasycené mastné kyseliny	g	8,5	1,1
MCT tuky	g	6,0	0,80
kyselina palmitová sn-2	g	0,55	0,07
mononenasycené mastné kyseliny	g	9,4	1,2
polynenasycené mastné kyseliny	g	5,2	0,69
Kyselina α-linolenová	mg	400	53
Kyselina dokosaheptaenová (DHA)	mg	135	18
Kyselina linolová	mg	4000	532
Kyselina arachidonová (ARA)	mg	135	18

Sacharidy (44 % kcal), z toho:	g	55,2	7,3
cukry	g	4,0	0,53
laktóza	g	<0,05	<0,0066
Vláknina (1 % kcal), z toho:	g	1,13	0,15
lakto-N-neotetraosa	g	0,38	0,05
2'-fukosyllaktosa	g	0,75	0,10
Bílkoviny ¹ (11 % kcal)	g	13,3	1,8
Sůl	g	0,49	0,065
Minerální látky			
Sodík	mg	195	26
Draslík	mg	570	76
Chloridy	mg	420	56
Vápník	mg	530	70
Fosfor	mg	350	47
Hořčík	mg	45	6,0
Železo	mg	5,0	0,66
Zinek	mg	5,0	0,66
Měď	mg	0,43	0,057
Mangan	mg	0,068	0,009
Selen	μg	26	3,5
Jód	μg	110	15
Vitamíny			
A	μg	500	66
D	μg	12,5	1,7
E	mg	11	1,5
K	μg	45,5	6,0
C	μg	80	11
Thiamin	mg	0,51	0,068
Riboflavin	mg	1,0	0,13
Niacin	mg	7,0	0,93
	mg NE	12	1,6
B6	mg	0,4	0,053
Kyselina listová	mg	75	10
Folát	μg DFE	125	17
B12	mg	1,5	0,2
Biotin	mg	12	1,6
Kyselina pantothenová	mg	3,3	0,44
Další živiny			
Taurin	mg	40	5,3
L-karnitin	mg	8,5	1,1
Cholin	mg	145	19
Inositol	mg	35	4,7

Osmolarita ... 299 mOsm/l

Osmolalita ... 333 mOsm/kg

NE = Niacin Ekvivalent, DFE = Ekvivalent folátu

*100 ml připravené výživy = 13,3 g prášku + 90 ml vody

¹ Představuje součet přidaných aminokyselin.

Celkový dusík x 6,25 g = 15,1 g bílkovin/100 g prášku.