

# CoMiSS: Skórovací systém pro hodnocení příznaků, které mohou souvisej s konzumací kravského mléka

Příjmení:

Jméno:

Věk:

Datum:

## ÚČEL

CoMiSS je jednoduchý, rychlý a snadno použitelný nástroj pro zvýšení informovanosti o symptomech souvisejících s konzumací kravského mléka. Zvyšuje povědomí o nejčastějších příznacích alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM), což může napomáhat časné diagnostice. CoMiSS lze také použít ke stanovení a kvantifikaci vývoje příznaků během terapeutické intervence.

## NÁVOD

Pokud máte podezření na symptomy v souvislosti s konzumací kravského mléka, ohodnoťte pozorované příznaky pomocí nejvíce odpovídajícího skóre pro každý příznak zvlášť. Poté sečtěte jednotlivá skóre a výsledek zaznamenejte do kolonky v zápatí skórovacího formuláře.

PŘÍZNAK	SKÓRE																								
Pláč*	<table><tr><td>0</td><td>≤ 1 hodina/denně</td></tr><tr><td>1</td><td>1 až 1,5 hodiny/denně</td></tr><tr><td>2</td><td>1,5 až 2 hodiny/denně</td></tr><tr><td>3</td><td>2 až 3 hodiny/denně</td></tr><tr><td>4</td><td>3 až 4 hodiny/denně</td></tr><tr><td>5</td><td>4 až 5 hodin/denně</td></tr><tr><td>6</td><td>≥ 5 hodin/denně</td></tr></table>	0	≤ 1 hodina/denně	1	1 až 1,5 hodiny/denně	2	1,5 až 2 hodiny/denně	3	2 až 3 hodiny/denně	4	3 až 4 hodiny/denně	5	4 až 5 hodin/denně	6	≥ 5 hodin/denně										
0	≤ 1 hodina/denně																								
1	1 až 1,5 hodiny/denně																								
2	1,5 až 2 hodiny/denně																								
3	2 až 3 hodiny/denně																								
4	3 až 4 hodiny/denně																								
5	4 až 5 hodin/denně																								
6	≥ 5 hodin/denně																								
Regurgitace (ublinkávání)	<table><tr><td>0</td><td>0 až 2 epizody/denně</td></tr><tr><td>1</td><td>≥ 3 až ≤ 5 epizod o malém objemu</td></tr><tr><td>2</td><td>&gt; 5 epizod o objemu &gt; 1 kávová lžička</td></tr><tr><td>3</td><td>&gt; 5 epizod o objemu ± polovina přijaté potravy u &lt; poloviny krmení</td></tr><tr><td>4</td><td>Nepřetržité ublinkávání malého objemu &gt; 30 min. po každém krmení</td></tr><tr><td>5</td><td>Ublinkávání poloviny až celého objemu přijaté potravy u alespoň poloviny krmení</td></tr><tr><td>6</td><td>Ublinkávání celého objemu přijaté potravy po každém krmení</td></tr></table>	0	0 až 2 epizody/denně	1	≥ 3 až ≤ 5 epizod o malém objemu	2	> 5 epizod o objemu > 1 kávová lžička	3	> 5 epizod o objemu ± polovina přijaté potravy u < poloviny krmení	4	Nepřetržité ublinkávání malého objemu > 30 min. po každém krmení	5	Ublinkávání poloviny až celého objemu přijaté potravy u alespoň poloviny krmení	6	Ublinkávání celého objemu přijaté potravy po každém krmení										
0	0 až 2 epizody/denně																								
1	≥ 3 až ≤ 5 epizod o malém objemu																								
2	> 5 epizod o objemu > 1 kávová lžička																								
3	> 5 epizod o objemu ± polovina přijaté potravy u < poloviny krmení																								
4	Nepřetržité ublinkávání malého objemu > 30 min. po každém krmení																								
5	Ublinkávání poloviny až celého objemu přijaté potravy u alespoň poloviny krmení																								
6	Ublinkávání celého objemu přijaté potravy po každém krmení																								
Charakter stolice (Bristolská škála)	<table><tr><td>4</td><td>Typ 1 a 2 (tvrdá stolice)</td></tr><tr><td>0</td><td>Typ 3 a 4 (normální stolice)</td></tr><tr><td>2</td><td>Typ 5 (měkká stolice)</td></tr><tr><td>4</td><td>Typ 6 (kašovitá stolice, nesouvisející s infekcí)</td></tr><tr><td>6</td><td>Typ 7 (vodnatá stolice)</td></tr></table>	4	Typ 1 a 2 (tvrdá stolice)	0	Typ 3 a 4 (normální stolice)	2	Typ 5 (měkká stolice)	4	Typ 6 (kašovitá stolice, nesouvisející s infekcí)	6	Typ 7 (vodnatá stolice)														
4	Typ 1 a 2 (tvrdá stolice)																								
0	Typ 3 a 4 (normální stolice)																								
2	Typ 5 (měkká stolice)																								
4	Typ 6 (kašovitá stolice, nesouvisející s infekcí)																								
6	Typ 7 (vodnatá stolice)																								
Kožní příznaky	<table><tr><td>0 až 6</td><td>Atopický ekzém</td><td>HLAVA-KRK-TRUP</td><td>PAŽE-RUCE-NOHY-CHODIDLA</td></tr><tr><td></td><td>Není přítomen</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Mírný</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Středně závažný</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>Závažný</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>0 až 6</td><td>Kopřivka</td><td>NE 0</td><td>ANO 6</td></tr></table>	0 až 6	Atopický ekzém	HLAVA-KRK-TRUP	PAŽE-RUCE-NOHY-CHODIDLA		Není přítomen	0	0		Mírný	1	1		Středně závažný	2	2		Závažný	3	3	0 až 6	Kopřivka	NE 0	ANO 6
0 až 6	Atopický ekzém	HLAVA-KRK-TRUP	PAŽE-RUCE-NOHY-CHODIDLA																						
	Není přítomen	0	0																						
	Mírný	1	1																						
	Středně závažný	2	2																						
	Závažný	3	3																						
0 až 6	Kopřivka	NE 0	ANO 6																						
Respirační příznaky	<table><tr><td>0</td><td>Žádné respirační příznaky</td></tr><tr><td>1</td><td>Nepatrné příznaky</td></tr><tr><td>2</td><td>Mírné příznaky</td></tr><tr><td>3</td><td>Závažné příznaky</td></tr></table>	0	Žádné respirační příznaky	1	Nepatrné příznaky	2	Mírné příznaky	3	Závažné příznaky																
0	Žádné respirační příznaky																								
1	Nepatrné příznaky																								
2	Mírné příznaky																								
3	Závažné příznaky																								

\* Pláč se počítá pouze tehdy, pokud dítě pláče po dobu jednoho týdne nebo déle bez jiné zřejmé příčiny.  
Zhodnoceno rodičem.

CELKOVÉ SKÓRE

## INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Skóre se pohybuje v rozmezí od 0 do 33. Každý příznak může dosáhnout maximálního skóre 6, kromě respiračních příznaků, kde je maximální skóre 3.

Pokud je celkové skóre ≥ 12, příznaky pravděpodobně souvisejí s konzumací kravského mléka. Může se potenciálně jednat o ABKM.

Pokud je celkové skóre <12, příznaky jen s malou pravděpodobností souvisejí s konzumací kravského mléka. Hledejte jiné příčiny.

**Diagnózu ABKM lze potvrdit pouze orálním potravinovým expozičním testem a následně eliminační dietou.**

Vandenplas, Y., Dupont, C., Eigenmann, P., Host, A., Kuitunen, M., Ríbes-Koninc, C., Shah, N., Shamir, R., Staiano, A., Szajewska, H. and Von Berg, A. (2015), A workshop report on the development of the Cow's Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. doi: 10.1111/apa.12902



Skórovací formulář CoMiSS k dispozici na: [www.nestlehealthscience.cz](http://www.nestlehealthscience.cz)



Nestlé Health Science

© Nestlé Health Science 2015